

COVID-19 VAKTSINEERIMISE NÕUSOLEK

COVID-19 on hingamisteede viiruslik nakkushaigus, täpsemat info leiab Terviseameti kodulehelt: <https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus>

COVID-19 vastu vaksineerimine on kasulik ning oluline, sest vähendab oluliselt Teie võimalust haigestuda COVID-19 infektsiooni. Nagu kõikide ravimite puhul, ei ole ka ükski vaktsiin 100% tõhus ning organismil kulub paar nädalat aega viirusevastase kaitse ülesehitamiseks. Mõned inimesed võivad vaatamata vaksineerimisele COVID-19 viirusesse siiski nakatuda, kuid vaksineerimine vähendab oluliselt Teie võimalust haiguse raskekujulisele põdemisele.

Rahvatervise seisukohast peate Te sellegi poolest jätkama üldiste ennetusmeetmetega nagu hea kätehügieen, distantsi hoidmine, maski kandmine ning kätega näo katsumise vältimine.

Teatud vaktsiinide puhul on oluline saada kindla aja jooksul ka teine doos. Täpsemat informatsiooni selle kohta annab Teile Teid vaksineeriv tervishoiutöötaja.

Täpsem info COVID-19 erinevate vaktsiinide omaduste (sh vastunäidustuste ja kõrvaltoimete) kohta on kättesaadav Ravimiameti koduleheküljel: <https://ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid>

Eestis kasutusel olevad vaktsiinid on kõik enne kasutusele võtmist läbinud põhjaliku ravimiohutuse alase hindamise ning on seetõttu parima teadmise alusel ohutud. Vaksineerimise kasu on võimalike riskide osas tugevalt positiivne. Mis iganes vaktsiinid võivad põhjustada paikseid reaktsioone ja üldnähte (peavalu, palavik, väsimus jt). Kõrvalnähud võivad olla häirivad, aga mööduvad üldjuhul paari päevaga. Reaktsioone saab vajadusel leevendada valuvaigisti või paikse külma kompressiga. Palaviku, oksendamise, tasakaaluhäirete vm üldnähtude korral tuleks puhata ja hoiduda järskudest liigutustest. Vajadusel pöörduda perearsti poole täiendava nõu saamiseks.

Raskete kõrvaltoimete (vaksineerimise järgselt üle 3 päeva kestev palavik, hingeldus, rindkere- või kõhuvalu, jäseme turse või jahedus, tugev/süvenev peavalu või ähmane nägemine, püsiv veritsus, väikesed verevalumid, punakad või lillakad täpid või verevillid nahal) tekkimisel tuleb pöörduda erakorralise meditsiini osakonda.

Kõrvaltoimete kohta on võimalik teavitada Ravimiametit nende koduleheküljel oleva vormi kaudu: <https://www.ravimiamet.ee/ravimi-korvaltoime-teatis-patsiendile>

Palume tutvuda ka COVID-19 vastu vaksineerimise patsiendi infolehega ning täiendavad küsimused esitada Teid vaksineerivale tervishoiutöötajale.

Patsiendi nimi ja isikukood: _____

Eeskestja nimi ja isikukood: _____

OLEN NÕUS vaksineerimisega COVID-19 vastu. KEELDUN vaksineerimisest.

Olen teadlik, et võin igal hetkel oma otsust vaksineerimise osas muuta.

Patsiendi allkiri _____ Kuupäev _____

Eeskestja allkiri _____ Kuupäev _____