


LAPAROSKOOPILINE NISSENI FUNDOPLIKATSIOON E. SÖÖGITORU LAHISONGA OPERATSIOON



Söögitoru lahisong on haiguslik seisund kus magu sopistub söögitoru kõrvalt vahelihasest kõrgemale rindkeresse.

Sellega seondub kõige sagedamini **kaebus kõrvetistele** – maohappe sattumine söögitorusse. Selle tagajärjeks on söögitoru ärritus, põletik, esineda võivad ka kõhahood.

Raviks on mitu võimalust: konservatiivne (tablettidega) või operatsiooniga. Suurte songade puhul on tabletravi pidev, mis mõjutab igapäevast elukvaliteeti. Tablettidele lisaks aitab enesetunde paranemisele kaasa ka kehakaalu langetamine ja voodi peaosa tõstmine.

Kui tabletravile ja elukorralduse muutusele vaatamata on kaebusi palju, tuleb mõelda operatsioonile.



Operatsioon tehakse narkoosis ja laparoskoopiliselt s.t. kõhule tuleb üldiselt viis väikest haava, mille kaudu viiakse kõhuõõnde optika ja instrumentid.


Vahelihase auk tihendatakse ja söögitoru ümber moodustatakse tagasivoolu klapp.

Peale operatsiooni tuleb kahel esimesel päeval tarbida vaid vedelat toitu, peale seda on lubatud üleminek tahkele toidule. Haiglaravi kestab tavaliselt 1-2 päeva.



Vähene liikumine on lubatud kohe peale operatsiooni, aga füüsiline koormus on lubatud alles 2 nädala möödumisel.

Töövabastus on tavaliselt 2 nädalat ja järelkontroll 1 kuu möödumisel operatsioonist.



Operatsioon annab püsiva tulemuse ning operatsioonijärgselt Te ravimeid enam ei vaja.

Koostatud: Kirurgiakliinik, üldkirurgia osakond, 2016

Ajakohastatud: Kirurgiakliinik, üldkirurgia osakond, oktoober 2024